

Post - Care

ใบท็อกซ์

[ใบท็อกซ์ลดริ้วรอย, ใบท็อกซ์ช้กราม, สกินใบท็อกซ์, ใบท็อกซ์ลดเหงื่อ (รักแร้), ใบท็อกซ์แก้ปัญหายิ้มเหินแหว่ง, ใบท็อกซ์ยกมุมปาก, ใบท็อกซ์ขมับ, ใบท็อกซ์ต่อน้ำลาย, บอดี้ใบท็อกซ์ร่างกาย]

ข้อควรระวังหลังทำหัตถการ



ห้ามพูด ถู หรือกดบริเวณที่ฉีดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และหลีกเลี่ยงการนอนราบเป็นเวลา 4 ชั่วโมงหลังฉีด



อาการฟกช้ำ บวม และกดเจ็บ อาจคงอยู่ได้ 1-2 สัปดาห์ ห้ามถู กด หรือออกแรงกดกับบริเวณที่ได้รับการรักษา



หลีกเลี่ยงการอบซาวน่า ความร้อนจัด และการออกกำลังกายหนักเป็นเวลา 1 สัปดาห์



งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่เป็นเวลา 7 วัน



ผลลัพธ์จะเห็นได้เต็มที่ภายใน 7-14 วันหลังการรักษา

* ข้อควรปฏิบัติเฉพาะตามบริเวณที่ฉีด *

ใบท็อกซ์กราม: หลีกเลี่ยงอาหารที่เหนียว แข็ง หรือใช้แรงเคี้ยวมาก เนื่องจากอาจทำให้ระยะเวลาของผลลัพธ์สั้นลง

ใบท็อกซ์บ้อง/ต้นขา: หลีกเลี่ยงการเดินระยะไกล การสวมรองเท้าส้นสูง และการนวดบริเวณดังกล่าวเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์

ใบท็อกซ์บ่า/แขน: หลีกเลี่ยงการยกของหนักและกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมากเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์

ใบท็อกซ์ต่อน้ำลาย: อาการปากแห้งเล็กน้อยถือเป็นเรื่องปกติ ควรดื่มน้ำให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ใบท็อกซ์ลดเหงื่อ: หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือกิจกรรมที่ทำให้เหงื่อออกมากเป็นเวลา 3-4 วัน

หากมีคำถามหรือข้อกังวลอื่น ๆ กรุณาติดต่อเราทาง [ไลน์](#)